


ASOS est une étude transversale, réalisée pendant une semaine auprès d'un échantillon national tiré au sort de 1500 pharmacies d'officine (métropole et départements d'Outre-Mer) sur la prescription d'antalgiques stupéfiants. Les objectifs sont de décrire la population traitée par antalgiques stupéfiants et les modalités de leur prescription, d'évaluer le respect des règles de prescription et de suivre l'évolution dans le temps de ces données.

RÉSULTATS 2018

En 2018, 151 pharmacies ont participé à l'enquête (taux de participation : 13,3 %) et 571 malades ont été inclus.



Nombre de malades par pharmacie par semaine (2004-2018)

PRESCRIPTEURS


Les médecins libéraux représentent 82,7 % des prescripteurs, les hospitaliers, 17,1 %, les CSAPA 0,2 %. Dans 83,1 % des cas, le prescripteur était généraliste, dans 16,9 % des cas, un autre spécialiste (cancérologue : 6 %, rhumatologue : 1,8 %, chirurgien : 1,2 %, algologue : 1,2 %, autres : 6,3 %).

MÉDICAMENTS

Les médicaments les plus prescrits sont :

- par DCI : fentanyl (36,7 %), morphine (32,1 %) et oxycodone (30,8 %).
- par spécialité : Durogésic® (27,2 %), Oxynorm(oro)® (15,6 %), Actiskéan® (15,4 %), Oxycontin® (15,2 %) et Skéan® (15,2 %). Il s'agissait d'un nouveau traitement dans 19 % des cas, d'un traitement de plus d'un an dans 36 % des cas.

PRESCRIPTION DES MÉDICAMENTS PAR INDICATION




Conformité des ordonnances	%
ordonnance sécurisée	95,4
posologie en lettres	92,6
carré de sécurité rempli	92,1
espace étroit dernière ligne/signature	71,9

CARACTÉRISTIQUES DES MALADES

L'âge moyen était de 68,1 ans (médiane : 69 ; extrêmes : 13 -103 ans) ; 41,5 % avaient 75 ans ou plus. Il y avait 63,3 % de femmes et 36,7 % d'hommes.

INDICATIONS

Dans 57,5 % des cas, il s'agissait d'une douleur chronique et dans 21,6 % des cas, d'une douleur aiguë (dans 2,5 % des cas, les deux).



Evolution des indications, 2004-2018

CONCLUSION

Le fentanyl reprend la tête des prescriptions devant la morphine suivie de l'oxycodone.

- Les résultats de cette 18^{ème} enquête montrent que :
- les indications rhumatologiques restent majoritaires mais en diminution,
 - les indications neurologiques sont en nette progression,
 - les indications « autres » restent stables avec l'oxycodone comme principale molécule prescrite,
 - les prescriptions de fentanyl transmuqueux sont à la baisse,
 - pour le fentanyl transdermique, les indications cancérologiques restent en 1^{ère} position devant les indications rhumatologiques et les indications neurologiques ont presque doublé,
 - toutes formes galéniques confondues, le fentanyl garde la première place dans les indications cancérologiques, juste devant l'oxycodone puis la morphine,
 - le nombre de malades sous oxycodone s'est stabilisé avec, cette année, des indications cancérologiques majoritaires.