



POURQUOI DIFFUSER LA NALOXONE ?

- Les **OPIOÏDES** sont impliqués dans la majorité des décès liés à l'abus de substances (Données DRAMES 2019)
- Dans de nombreux cas, les surdoses d'opioïdes ont lieu en présence d'un **TÉMOIN**
- La **NALOXONE**, l'**ANTIDOTE spécifique aux opioïdes**, est disponible sous formes nasale ou intra-musculaire utilisables par tous (Ministère des solidarités et de la santé)
- Parmi les consommateurs d'opioïdes, **SEUL 1/5 avait de la naloxone à sa disposition** (Données OPPIDUM 2020)

LES 3 SIGNES D'UNE SURDOSE AUX OPIOÏDES



DÉPRESSION RESPIRATOIRE

Respiration faible ou irrégulière
< 10 respirations par minute
Lèvres et ongles bleus



TROUBLES DE LA CONSCIENCE

Sédation
Coma
Pas de réaction au bruit ou au toucher



MYOSIS (PUPILLES RÉTRÉCIES)

MAIS signe souvent masqué par prise concomitante d'autres substances

DEUX FORMES DE NALOXONE DISPONIBLES

NASALE



NYXOID®

Contenu des kits

1 kit = 1 surdose

Demander un nouveau kit après utilisation

- 2 pulvérisateurs
- Une notice
- Un guide d'initiation rapide imprimé au dos

- 1 seringue pré-remplie
- 2 aiguilles à assembler
- Une notice
- Une boîte en plastique rigide

INJECTABLE INTRA MUSCULAIRE



PRENOXAD®

	NYXOID® <i>Depuis septembre 2021</i>	PRENOXAD® <i>Depuis juin 2019</i>
Indication thérapeutique	Traitement d'urgence des surdoses opioïdes à partir de 14 ans	Traitement d'urgence des surdoses opioïdes à partir de 18 ans
Conditionnement	2 pulvérisateurs 1 dose par pulvérisateur 2 doses disponibles	Une seringue pré-remplie 1 dose par graduation 5 doses disponibles
Modalités d'administration	Appeler les secours (15 ou 112) 1 ^{ère} dose 2 ^{ème} dose si pas d'amélioration après 2 à 3 minutes	
Conditions de prescription	Liste I <i>Prescription médicale obligatoire</i>	Liste I <i>Prescription médicale facultative</i>
Lieux de dispensation	En pharmacie d'officine En CSAPA A l'hôpital	En pharmacie d'officine En CSAPA & CAARUD A l'hôpital
Prix et remboursement	31,40€ TTC Taux de remboursement : 65%	22,16€ TTC Taux de remboursement : 65%
Commande	Auprès du dépositaire CSP (par mail : pharmacie@csp-epl.com ou par fax : 09 71 00 70 35)	Auprès des différents grossistes répartiteurs
Formation et informations	« Une heure pour apprendre à sauver une vie » sur naloxone.fr « Surdoses (overdose) d'opioïdes : la naloxone est utilisable par tous et peut sauver la vie » sur le site du ministère des solidarités et de la santé	
	https://www.mundipharma.fr/nos-medicaments/antidote	prenoxad.fr


NYXOID® QUELLES DIFFÉRENCES AVEC NALSCUE® ?

Nalscue®, forme nasale, a été disponible de juillet 2016 à décembre 2020. Quelques différences sont à noter :

	NYXOID®	NALSCUE®
Pulvérisateurs par boîte	2	4
Dose par boîte	2	
Administration	1 dose = 1 pulvérisation dans une seule narine (1 dose = 1 pulvérisateur dans une narine = 1 pulvérisateur)	1 dose = 1 pulvérisation dans chaque narine (1 dose = 1 pulvérisateur différent pour chaque narine = 2 pulvérisateurs)
Âge minimum	A partir de 14 ans	A partir d' 1 mois
Modalités d'administration	Administrer la 2 ^{ème} dose après 2 à 3 minutes sans amélioration. Pulvériser dans l'autre narine si possible	Administrer la 2 ^{ème} dose après 4 à 5 minutes sans amélioration. Pulvériser de nouveau dans chaque narine
Modalités de prescription	Prescription obligatoire	Prescription facultative

RÉAGIR À UNE SURDOSE AUX OPIOÏDES

- 1 APPELER les secours (15 ou 112)**
- 2 ADMINISTRER UNE DOSE** de naloxone
Prenoxad® ou Nyxoid®
- 3 SURVEILLER LA RESPIRATION**
- 4 RÉADMINISTRER** une dose si absence d'amélioration au bout de 2/3 min
- 5 PLACER** le patient en **Position Latérale de Sécurité** et **SURVEILLER en attendant les secours**



À QUI DIFFUSER LA NALOXONE EN PRIORITÉ ?

AUX PERSONNES À RISQUE DE SURDOSE AUX OPIOÏDES ET A LEUR ENTOURAGE

QUI ?

- Consommateurs d'opioïdes : de **MEDICAMENTS DE SUBSTITUTION AUX OPIOIDES (MSO)**, de **MEDICAMENTS OPIOIDES ANTALGIQUES**, de **SUBSTANCES OPIOIDES ILLICITES**

QUELLES SONT LES PRINCIPALES SITUATIONS A RISQUE ?

- INITIATION** d'un traitement (MSO ou opioïde antalgique)
- PERTE DE TOLÉRANCE** après arrêt ou diminution des prises d'opioïdes
- Usages **À RISQUE/MESUSAGE** (poly-consommations, injection, augmentation des doses, recherche d'effets psychoactifs...)
- DÉPENDANCE**
- ANTÉCÉDENT** récent de surdose aux opioïdes
- Usage **RÉCRÉATIF** notamment chez des sujets naïfs d'opioïdes
- Usage en « **AUTO SUBSTITUTION** » pour soulager une opio-dépendance
- INTOXICATION ACCIDENTELLE** (enfants, adolescents, adultes)

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question sur les médicaments et substances psychoactives, pour toute déclaration de cas d'abus ou de pharmacodépendance