

OPPIDUM (Observation des Produits Psychotropes Illicites ou Détournés de leur Utilisation Médicamenteuse) est un dispositif de pharmacosurveillance et de veille sanitaire sur les substances psychoactives (SPA) du Réseau Français d'Addictovigilance existant depuis plus de 30 ans. Il repose sur des enquêtes transversales, nationales et multicentriques menées chaque année au mois d'octobre. Il recueille, sur l'ensemble du territoire, grâce à une collaboration de proximité avec les structures spécialisées dans les addictions, des informations sur les modalités de consommation des SPA prises la semaine précédant l'enquête par les patients présentant un abus, une dépendance, ou sous médicaments de substitution aux opiacés (MSO).


UNE PARTICIPATION REMARQUABLE EN 2024

320 structures ont participé au dispositif en 2024 contribuant à des informations relatives à **5 591 sujets**, décrivant **11 522 modalités de consommations de SPA** (dont 56,4% de médicaments). Les sujets provenaient de CSAPA (65%), de CAARUD (14,5%), des unités de consultation (8%), des équipes de liaison en addictologie (5%) et des unités de soins en milieu carcéral (4%).

KÉTAMINE : UNE CONSOMMATION TOUJOURS EN AUGMENTATION

En 2024, 167 sujets sont consommateurs de kétamine (versus n=32 en 2014). 51% de ces sujets ont un usage quotidien ou hebdomadaire ; 33% déclarent une dépendance et 36% une souffrance à l'arrêt. Ces profils exposent davantage aux complications cliniques (uro-néphrologiques, hépatobiliaires). Six fois plus de sujets déclarent la kétamine comme 1^{er} produit ayant entraîné une dépendance en deux ans (n=30 en 2024 versus n=5 en 2022).

On note également 3 consommations de dérivés de la kétamine : 2F-DCK (n=2), O-PCE(n=1).



COCAINE : UNE CONSOMMATION AU NIVEAU LE + HAUT

En 2024, 31% des sujets sont consommateurs de cocaïne (n=1757 versus n=1648 en 2023).

La forme *freebase* (inhalée) atteint 56%. Dans près de la moitié des cas, la cocaïne est consommée avec de l'alcool. De plus, 44% des sujets déclarent une dépendance.

Parmi les consommateurs de cocaïne *freebase* et de crack, la consommation dans le cadre d'une dépendance atteint 50%.

SIX NOUVEAUX PRODUITS DE SYNTHÈSE (NPS) NOUVELLEMENT CITÉS EN 2024


Six NPS ont été nouvellement cités : 2 cathinones (alpha-PiPH et B13), 2 designer benzodiazépines (bromazolam et deschloroetizolam), 1 dérivé de la kétamine (O-PCE), 1 cannabinoïde (THCJD).

En 2024, 95 sujets ont consommé au moins 1 NPS (dont 84% une cathinone) et ont décrit les modalités de consommation de 23 NPS différents.

PREGABALINE : DES CONSOMMATIONS QUI AUGMENTENT EN 2024

En 2024, 70 consommations de prégabaline ont été rapportées (versus 59 en 2023). Elles s'accompagnent d'une augmentation de certains indicateurs de détournement notamment l'obtention illégale, l'abus/dépendance et la souffrance à l'arrêt. De plus, près de 2/3 des consommateurs l'obtiennent illégalement.

QUELS FAITS ÉMERGENTS PARMIS LES MÉDICAMENTS OPIOÏDES ?



TRAMADOL

Une nouvelle augmentation des sujets déclarant le tramadol comme 1^{er} produit ayant entraîné la dépendance est constatée en 2024 (93 sujets en 2024 versus 68 sujets en 2023). De plus, 2/3 des consommateurs déclarent un abus et/ou une dépendance et plus d'1/3 l'obtiennent illégalement.

OXYCODONE

En 2024, le nombre de sujets consommateurs d'oxycodone continue d'augmenter (n=30 versus 25 en 2023). 3/4 des consommateurs déclarent une dépendance et une souffrance à l'arrêt. De plus la moitié de ces sujets obtiennent l'oxycodone illégalement.



Ces données montrent une émergence des sujets vus en structures spécialisées dans les addictions dans le cadre de dépendance au tramadol ou à l'oxycodone.

CODEINE (seule ou en association)

En 2024, on constate une augmentation des sujets déclarant la codéine comme 1^{er} produit ayant entraîné une dépendance (n=110 versus 79 en 2023).

NALOXONE : UNE CONNAISSANCE ET UN ACCÈS EN AUGMENTATION MAIS ENCORE TROP FAIBLES

En 2024, la diffusion de naloxone a très peu augmenté et reste toujours insuffisante avec 31% des sujets consommateurs d'opioïdes qui n'ont toujours pas connaissance de la mise à disposition d'un kit de naloxone auprès des usagers (vs 33% en 2023) ; et 64% des sujets qui n'ont pas de kit de naloxone en 2024 (vs 66% en 2023).

MÉTHADONE : DES CONSOMMATIONS ASSOCIÉES TOUJOURS UNE AUGMENTATION

En 2024, 32% des sujets consommateurs de méthadone consomment également de la cocaïne ou du crack pouvant entraîner une augmentation du risque de trouble du rythme cardiaque. 19% des sujets consomment également de l'héroïne et 28% de l'alcool pouvant entraîner une augmentation du risque de dépression respiratoire.

Pour rappel, la dépression respiratoire et la sédation/coma sont réversibles par l'utilisation de l'antidote naloxone mais pas les allongements de l'intervalle QT liés au blocage des canaux potassiques HERG au niveau cardiaque.

Remerciements aux équipes ayant participé en 2024 Nous espérons vous associer à l'enquête OPPIDUM n°37 du 29 septembre au 26 octobre 2025.

Document réalisé avec le soutien de l'ANSM

CEIP-Addictovigilance PACA Corse - Centre coordonnateur national



Service de Pharmacologie Clinique et Pharmacovigilance

Hôpital Sainte-Marguerite – Hôpitaux de Marseille – AP-HM
270 BD Sainte-Marguerite – 13009 Marseille

Mai : addictovigilance@ap-hm.fr Tel.: +33(0).491.74.50.25