

Présentation d'OPPIDIUM

C'est une étude pharmacoépidémiologique transversale annuelle, répétée au mois d'octobre. Opérationnelle depuis 1995, elle s'appuie sur un réseau de structures spécialisées dans la prise en charge des addictions et permet de recueillir, grâce aux professionnels de terrain, des informations sur les modalités de consommation des substances psychoactives [SPA] prises la semaine précédant l'enquête par les patients présentant un abus, une pharmacodépendance, ou sous traitement de substitution aux opiacés.

Participation

Au cours de l'enquête #21 qui s'est déroulée du 5 octobre au 1^{er} novembre 2009, 126 centres d'enquête ont inclus 4774 sujets, décrivant la consommation de 9536 substances psychoactives. Ces chiffres sont en baisse après les participations historiques de 2007 et 2008. Depuis 1990 et le lancement du programme, 45.609 sujets ont été inclus et 92.287 substances psychoactives décrites.

Caractéristiques des sujets inclus

Leur moyenne d'âge est de 33,0 ans (+/- 8,7 ans). Ce sont majoritairement des hommes (78%). La majorité signale disposer d'un logement stable (83%) et de revenus réguliers (55%). 42% sont en activité professionnelle.

Première consommation & première dépendance

Hors tabac et alcool, le premier produit psychoactif consommé (à l'âge moyen de 16,3 ans) est le cannabis (79% des sujets inclus), l'héroïne (11%), un médicament (4%). Le premier produit psychoactif ayant entraîné une dépendance (à l'âge moyen de 19,9 ans) est l'héroïne (66% des sujets), le cannabis (22%), un médicament (6% ; dont BHD ou méthadone = 2% des sujets inclus).

Comportements globaux de consommation

20% des sujets inclus présentent une dépendance alcoolique. 8% sont usagers de SPA par voie IV, et 19% par voie nasale.

Produits illicites

- 18% des sujets inclus sont consommateurs d'HEROÏNE ou speedball.
- 11% des sujets inclus sont consommateurs de COCAÏNE ou crack.
- Voies d'administration :
 - 70 % par sniff
 - 22 % par voie IV
 - 21 % par inhalation
- Voies d'administration :
 - 64% par sniff
 - 25% par voie IV
 - 25% par inhalation
- Prise quotidienne : 35% [vs. 48% en 2007, 40% en 2008]
- Prise quotidienne : 21% [vs. 18% en 2007 et 2008]
- 61% des sujets inclus sont consommateurs de CANNABIS (prise quotidienne : 61%)

Médicaments hypnotiques et anxiolytiques

TABLEAU 1 : Indicateurs de détournement des principales benzodiazépines et apparentés.

	Nb fiches	Dose > 2 AMM	Souffrance à l'arrêt	Abus ou dépendance	Obtention illégale	Prise concomitante d'alcool
Oxazépam	178	5%	49%	61%	17%	41%
Diazépam	171	3%	46%	50%	21%	35%
Bromazépam	163	2%	43%	61%	22%	28%
Alprazolam	120	1%	44%	51%	19%	25%
Clonazépam	116	8%	53%	77%	34%	41%
Zopiclone	111	6%	28%	23%	5%	12%
Clorazépate dipotassique	96	4%	39%	43%	17%	22%
Zolpidem	75	12%	37%	45%	8%	15%
Flunitrazépam	47	30%	41%	74%	48%	43%

Autres médicaments

TABLEAU 2 : Indicateurs de détournement des principaux autres médicaments signalés (N ≥ 45 ; hors TSO).

	N	Abus dépen-dance	Obtent° illégale	Prise conc. alcool
Cyamemazine	135	18%	7%	13%
Hydroxyzine	86	13%	0%	8%
Olanzapine	79	11%	0%	17%
Escitalopram	65	5%	2% ¹	13%
Morphine	63	75%	64%	28%
Venlafaxine	61	22%	0%	16%
Paroxetine	46	4%	0%	13%
Mepro. asso ²	45	37%	4% ³	21%

¹ N Obtention Illégale = 1

² Méprobamate en association

³ N Obtention Illégale = 2

TRAITEMENTS DE SUBSTITUTION DE LA DEPENDANCE AUX OPIACES

■ 75% des sujets inclus bénéficient d'un **protocole** de substitution :

- 63,1% sous protocole
méthadone
- 36,4% sous protocole
buprénorphine haut-dosage
- 0,5% sous protocole
avec un **autre médicament**

① Sujets consommant de la méthadone (N=2351)

- **Sous protocole de substitution ou non :**
 - 97,1 % **sous** protocole ;
 - 2,9 % **hors** protocole.
 - **Focus méthadone gélule :** de 11% des sujets consommateurs de méthadone en 2008 à 20% en 2009.
- **Selon la forme galénique :**
 - 77,9% consomment la forme **sirop** ;
 - 19,6% consomment la forme **gélule** ;
 - 2,4% consomment une forme **non précisée** ;
 - 0,1% consomment de la méthadone **belge** (N=3).

② Sujets consommant de la buprénorphine haut dosage [BHD] (N=1400)

- **Sous protocole de substitution ou non :**
 - 94,0 % **sous** protocole ;
 - 6,0 % **hors** protocole.
 - **Focus BHD générique :** de 31% des sujets consommateurs de BHD en 2008 à 38% en 2009.
- **Selon la spécialité :**
 - 60,7% consomment **Subutex®** ;
 - 37,9% consomment une **spécialité générique** ® :
 - 22,1% BHD Mylan®
 - 8,2% BHD Arrow®
 - 7,6% un générique non précisé
 - 1,8% consomment une **spécialité non précisée**.

TABLEAU 4

Modalités d'usage de la buprénorphine HD

		sous protocole		Hors protocole ²
		Subutex®	génériques ¹	
N		775	529	85
Age	Moyenne	34,7	32,1	31,0
	Ecart-type	8,6	8,2	8,5
% d'homme		78%	78%	88%
Activité professionnelle		39%	47%	26%
Logement stable		82%	84%	61%
Posologie (mg/j)	Moyenne	9,0	7,3	9,7
	Ecart-type	5,9	5,0	5,9
Voies d'administration ³	orale	92%	98%	49%
	nasale	10%	4%	46%
	inhalée	N=3	N=1	0%
	IV	9%	4%	16%
Obtention illégale		10%	6%	90%
Consommateurs d'héroïne		15%	14%	56%

¹ Toutes spécialités confondues : Arrow®, Mylan® et non précisé.
² Toutes spécialités confondues : Subutex®, génériques et non précisé.
³ Plusieurs réponses possibles.

TABLEAU 3

Modalités d'usage de la méthadone

		sous protocole		Hors protocole ¹
		sirop	gélule	
N		1806	459	69 ²
Age	Moyenne	33,4	36,5	29,2
	Ecart-type	7,9	8,6	6,6
% d'homme		76%	74%	84%
Activité professionnelle		41%	48%	39%
Logement stable		86%	93%	80%
Posologie (mg/j)	Moyenne	63,5	56,5	58,7
	Ecart-type	33,0	34,8	33,6
Voies d'administration	orale	100%	100%	99%
	nasale	0	0	0
	inhalée	N=1	0	0
	IV	0	0	N=1
Obtention illégale		4%	N=4	99%
Consommateurs d'héroïne		20%	11%	72%

¹ Toutes formes et spécialités confondues
² Dont : 2 gélule, 25 sirop 42 non précisé.

Remerciements

Nous tenons à remercier :

- les **centres d'enquêtes** ayant participé au programme en 2009 ;
- les **CEIP-Addictovigilance** (Centre d'Evaluation et d'Information sur la Pharmacodépendance et d'Addictovigilance), coordinateurs de l'enquête, situés à Bordeaux, Caen, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille Montpellier, Nancy, Nantes, Paris, Poitiers et Toulouse.

Nous espérons vous associer à l'enquête OPPIDUM#22, qui se déroulera du 4 au 31 octobre 2010.

CEIP-ADDICTOVIGILANCE PACA-CORSE

Unité de Pharmacologie Clinique – Hôpital La Timone, CHU de Marseille – Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille



264 rue Saint Pierre – 13385 Marseille cedex 5

+33(0).491.38.75.63

+33(0).491.47.21.40

joelle.micallef@ap-hm.fr