

## présentation du programme

OPPIDUM (Observation des Produits Psychotropes Illicites ou Détournés de leur Utilisation Médicamenteuse) est une étude pharmacoépidémiologique transversale annuelle, répétée au mois d'octobre. Opérationnelle depuis 1995 au niveau national, elle s'appuie sur un réseau de structures spécialisées dans la prise en charge des addictions et permet de recueillir, grâce aux professionnels de terrain, des informations sur les modalités de consommation des substances psychoactives [SPA] prises la semaine précédant l'enquête par les patients présentant un abus, une pharmacodépendance, ou sous traitement de substitution aux opiacés.

### principaux objectifs

- 1 caractériser la situation socio-économique des sujets inclus et les modalités de consommation des produits ;
- 2 évaluer l'abus et la pharmacodépendance des produits ;
- 3 décrire les usages des médicaments de substitution aux opiacés.

### participation à l'enquête 2011

Au cours de l'enquête n°23 qui s'est déroulée du 3 au 30 octobre 2011, 137 centres d'enquête (répartis dans 55 départements ou collectivités territoriales d'outre-mer) ont inclus 5.189 sujets, décrivant la consommation de 10.408 SPA. Au total, le programme OPPIDUM rassemble les observations relatives à 55.941 sujets et 113.024 consommations de SPA depuis sa création.

## 1 situation socioéconomique des sujets & modalités de consommation des produits

### situation socioéconomique des sujets

La moyenne d'âge des sujets inclus est de 34,5 ± 9,5 ans. Ce sont majoritairement des hommes (77%). 84% disposent d'un logement stable et 50% de revenus réguliers. 42% sont en activité professionnelle.

### première consommation et première dépendance

Hors tabac et alcool, le premier produit consommé (à l'âge moyen de 16,3 ans) est le cannabis (78% des sujets inclus), l'héroïne (11%), un médicament (4%). Le premier produit ayant entraîné une dépendance (à l'âge moyen de 20,2 ans) est l'héroïne (67% des sujets), le cannabis (21%), un médicament (7% ; dont buprénorphine HD [BHD] ou méthadone = 2,0% des sujets inclus).

### dépendance alcoolique & consommations actuelles de substances illicites

21% des sujets présentent une dépendance alcoolique. Les sujets inclus sont consommateurs d'héroïne à 12% (dont prise quotidienne [pQuo]=28%), consommateurs de cocaïne ou de crack à 10% (pQuo=17%), et de cannabis à 38% (pQuo=63%).

### voie(s) d'administration

- 7% des sujets sont consommateurs de substances psychoactives par voie IV.
- 15% des sujets sont consommateurs de substances psychoactives par voie nasale (« sniff »).
- 6% des sujets sont consommateurs de substances psychoactives par voie inhalée (fumée), hors consommations de cannabis.
- Pour les substances illicites :
  - L'héroïne est consommée par « sniff » à 69%, par voie IV à 23% et par inhalation à 22%. (n=3184)
  - La cocaïne est consommée par « sniff » à 56%, par voie IV à 25% et par inhalation à 34%.
- Pour les médicaments :
  - 3,1 % sont injectés (n=215), dont BHD (n=98), morphine (n=90), méthylphénidate (n=12). (n= 6958)
  - 1,7% sont sniffés (n=120), dont BHD (n=87), kétamine (n=12), morphine (n=10).
  - 0,4% sont fumés (n=27), dont BHD (n=12), méthadone (n=5, dont 4 « sirop »), salbutamol (n=2).

### obtention illégale des médicaments

- 13% des sujets inclus ont obtenu au moins un médicament illégalement, dont 3,4% rapportent une obtention exclusivement illégale.
- 739 médicaments ont été obtenus illégalement (en partie à 41% et en totalité à 59%) : par deal (n=512), don (n=198), prescripteurs multiples (n=125), fausse ordonnance (n=17), vol (n=5), ou internet (n=4) (plusieurs réponses possibles).

## 2 évaluer l'abus et la pharmacodépendance des produits

### indicateurs de détournement des principales benzodiazépines

	n fiches	dose > 2 A M M	souffrance à l'arrêt	abus ou dépendance	obtent° illégal	a l c o o l concomitant
Oxazépam	248	2%	45%	49%	19%	37%
Diazépam	231	2%	40%	49%	16%	34%
Zopiclone	141	5%	30%	20%	5%	12%
Bromazépam	134	1%	53%	57%	23%	23%
Clonazépam	117	9%	51%	72%	40%	39%
Alprazolam	112	6%	51%	57%	12%	16%
Zolpidem	110	6%	36%	31%	12%	12%
Clorazépate dipotassique	63	2%	43%	48%	17%	22%
Prazépam	52	0%	22%	30%	6%	6%
Flunitrazépam	49	23%	64%	77%	56%	34%

L é g e n d e : par indicateur, médicament ayant le % en position

1

2

3

dernière

### ③ décrire les usages des médicaments de substitution aux opiacés

79% des sujets inclus bénéficient d'un **protocole de substitution** :

autres médicaments signalés :  
Skénan® (n=21), Dicodin® (n=3),  
Moscontin® (n=2),  
Durogesic® (n=1)...

66 % sous protocole **méthadone**    33% sous protocole **bhd**    0,7% avec un **autre médicament**

☐ sujets consommant de la **méthadone** (n=2806)

☐ sous **protocole** de substitution ou non :

- 97% sous protocole
- 3% hors protocole

☐ selon la **forme galénique** :

- 67% consomment la forme **sirop**
- 30% consomment la forme **gélule**
- 2,5% consomment une forme **non précisée**
- 0,1% consomment de la méthadone **belge** (n=5)

☐ focus « **gélule vs. sirop** » :

**31%** de sujets consommateurs de gélule parmi les consommateurs de sirop ou gélule (vs. 25% en 2010, 20% en 2009 et 11% en 2008).

☐ méthadone : modalités d'usage	sous protocole		hors
	sirop	gélule	protocole <sup>1</sup>
N	1858	833	82
Age (années, moyenne ± e.t.)	34,3 ± 8,7	37,0 ± 8,8	31,0 ± 8,0
% d'homme	77%	75%	77%
Activité professionnelle	40%	49%	35%
Logement stable	84%	89%	90%
Posologie (mg/j, moyenne ± e.t.)	60,9 ± 35,2	56,3 ± 40,4	56,6 ± 28,4
Voie(s) orale	100%	100%	100%
d'administration <sup>2</sup> nasale	n=0	n=1	n=1
inhalée	n=4	n=0	n=0
IV	n=1	n=1	n=0
Obtention illégale	4%	1%	98%
Consommateurs d'héroïne	16%	6%	61%

<sup>1</sup> Toutes formes et spécialités confondues : indéterminée (n=38), sirop (n=34), gélule (n=9) et belge (n=1)

<sup>2</sup> Plusieurs réponses possibles.

☐ sujets consommant de la **buprénorphine haut-dosage** (n=1436)

☐ sous **protocole** de substitution ou non :

- 94% sous protocole
- 6% hors protocole

☐ selon la **spécialité** :

- 57% consomment **Subutex®**
- 35% consomment une spécialité **générique**
  - 18% un générique non précisé
  - 7% BHD Arrow®
  - 7% BHD Mylan®
  - 1,7% BHD Teva®
  - 1,0% BHD Biogaran®
  - 0,7% BHD Sandoz®
- 8% consomment une spécialité **non précisée**.

☐ focus « **spécialités génériques vs. princeps** » :

**38%** de sujets consommateurs de génériques parmi les consommateurs de princeps ou générique (vs. 38% en 2010, 39% en 2009, 32% en 2008)

☐ bhd : modalités d'usage	sous protocole		hors
	Subutex®	génériques <sup>1</sup>	protocole <sup>2</sup>
N	749	496	88
Age (années, moyenne ± e.t.)	35,9 ± 9,1	35,1 ± 9,2	34,1 ± 8,5
% d'homme	78%	78%	91%
Activité professionnelle	45%	47%	30%
Logement stable	84%	78%	72%
Posologie (mg/j, moyenne ± e.t.)	9,2 ± 5,5	6,8 ± 4,8	9,4 ± 6,1
Voie(s) orale	95%	98%	59%
d'administration <sup>3</sup> nasale	5%	2%	34%
inhalée	0,7%	0,4%	3,4% (n=3)
IV	8%	3%	26%
Obtention illégale	7%	6%	92%
Consommateurs d'héroïne	9%	9%	38%

<sup>1</sup> Toutes spécialités confondues : Arrow®, Mylan®, Biogaran®, Sandoz®, Teva® et non précisé.

<sup>2</sup> Toutes spécialités confondues : Subutex® (n=68), SAI (n=14), Arrow® (n=4), Mylan® (n=1), GNR non précisé (n=1).

<sup>3</sup> Plusieurs réponses possibles.

### conclusion : les principales tendances observées

- Bon niveau de participation, amélioration de la représentativité territoriale (↗ du nombre de départements)
- Diminution de la consommation d'**héroïne** et du recours à la **voie nasale**
- Augmentation de la part du **Zolpidem** parmi les benzodiazépines, et de la consommation de **Kétamine** (ntt par voie IV).
- Essaimage des pratiques de détournement du **Méthylphénidate** en dehors de la région PACA.

### remerciements

- aux **centres d'enquête** participants en 2011 : nous espérons vous associer à l'enquête oppidum n°24, en octobre 2012.
- aux **centres d'addictovigilance** (CEIP-Addictovigilance), coordinateurs de l'enquête, situés à Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Paris, Poitiers et Toulouse.

## centre d'addictovigilance paca corse

Centre d'Evaluation et d'Information sur la Pharmacodépendance et d'Addictovigilance  
Hôpital la Timone, CHU de Marseille – Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille



264 rue Saint Pierre – 13385 Marseille cedex 5



+33(0).491.38.75.63



joelle.micallef@ap-hm.fr

www.observa-tion-pharmacodépendance.org  
www.addictovigilance.fr/marseille