

ASOS est une étude transversale, réalisée pendant une semaine auprès d'un échantillon national tiré au sort de 1500 pharmacies d'officine (métropole et départements d'Outre-Mer) sur la prescription d'antalgiques stupéfiants. Les objectifs sont de décrire la population traitée par antalgiques stupéfiants et les modalités de prescription de ces antalgiques, d'évaluer le respect des règles de prescription des antalgiques, de voir l'évolution dans le temps des traitements par antalgiques stupéfiants.

## Résultats 2012

En 2012, 231 pharmacies ont participé à l'enquête (taux de participation : 15,4 %) et 618 malades ont été inclus. Le nombre moyen de malades était de 2,68 par pharmacie par semaine.

### Caractéristiques des malades

L'âge moyen était de 66,7 ans (médiane: 67 ; extrêmes : 6-102 ans) ; 40 % avait 75 ans ou plus. Il y avait 57,6 % de femmes et 42,4 % d'hommes.

### Prescripteurs


Les médecins libéraux représentaient 82,4 % des prescripteurs, les hospitaliers 17,6 %.

Dans 82,8 % des cas, le prescripteur était généraliste, dans 17,2 % des cas un autre spécialiste (oncologie : 34,7 % ; rhumatologie : 11,2 % ; centre anti-douleur : 10,2 % ; gériatrie et soins palliatifs : 7,1 % ; gastroentérologie : 6,1 % ; pneumologie : 4,1 % ; néphrologie : 2 % ; autres: 24,5 %).

### Indications

Dans 62,1 % des cas, il s'agissait d'une douleur chronique et dans 20,3 % des cas, d'une douleur aiguë (dans 3 % des cas, les deux).


En 2012, les indications rhumatologiques sont majoritaires.



### Médicaments

Les médicaments les plus prescrits sont :

- par spécialité : Durogésic® et génériques (34 %), Skénan® (17,5 %), Actiskénan® (14,1 %) et Oxycontin® (13,7 %).
- par DCI : fentanyl (39,1 %), morphine (34,3 %) et oxycodone (25 %)



### Ancienneté du traitement

Il s'agissait d'un nouveau traitement dans 22,6 % des cas, d'un traitement de plus d'un an dans 37,4 % des cas.

### Prescription de fentanyl

#### Fentanyl, toutes voies d'administration confondues

295 malades

âge moyen : 72,4 ans; âge médian : 77 ans ; extrêmes : 24 -102 ans

#### Fentanyl, durée d'action longue

274 malades

indication (connue dans 192 cas) : rhumatologie (n=76), cancérologie (n=65), neurologie (n=25), autres (n=27)

#### Fentanyl, durée d'action rapide

40 malades (Abstral®, n=15 ; Actiq®, n=11 ; Instanyl®, n = 8 ; Effentora®, n=4 ; Pecfent®, n=3)

indication (connue dans 31 cas) : cancérologie (n=14, traitement de fond associé dans 9 cas), neurologie (n=5), rhumatologie (n=3), autres (n=10)

## Comparaison des 3 dernières enquêtes ASOS, 2010-2012

délivrance d'antalgiques stupéfiants	2010	2011	2012
nombre de pharmacies participantes	246	256	231
pas de délivrance dans la semaine (%)	11	11,3	15,2
nombre de sujets inclus	623	642	618
nombre moyen / semaine / pharmacie	2,53	2,51	2,68
âge moyen (médiane ; extrêmes)	65 (65 ; 17-100)	65 (65 ; 6-98)	66,7 (67 ; 6-102)
sexe (%)	H 41,7 ; F 58,3	H 39,2 ; F 60,8	H 42,4 ; F 57,6
prescripteurs libéraux (%)	84,1	82,2	82,4
médecins généralistes (%)	84,4	84,2	82,8
non-conformité (%)			
ordonnance non sécurisée	5,2	6,2	6,5
posologie en chiffres	12	13,9	18,3
carré de sécurité non rempli	16,7	18,8	14,9
espace dernière ligne/signature	27,9	32,9	33
spécialités les plus prescrites (%)	Durogésic® et génériques : 32,5	Durogésic® et génériques : 34,5	Durogésic® et génériques : 34
	Skénan® : 20,5	Skénan® : 20,2	Skénan® : 17,5
	Actiskénan® : 19	Actiskénan® : 15,2	Actiskénan® : 14
	Oxycontin® : 11,4	Oxycontin® : 11,6	Oxycontin® : 13,7
nouveaux traitements (%)	22,5	21	22,6
douleur calmée (%)	82,2	73,9	73
ancienneté traitement > 6 mois (%)	44,9	45	50,6