

ASOS est une étude transversale, réalisée pendant une semaine auprès d'un échantillon national tiré au sort de 1500 pharmacies d'officine (métropole et départements d'Outre-Mer) sur la prescription d'antalgiques stupéfiants. Les objectifs sont de décrire la population traitée par antalgiques stupéfiants et les modalités de prescription de ces antalgiques, d'évaluer le respect des règles de prescription des antalgiques, de voir l'évolution dans le temps des traitements par antalgiques stupéfiants.

RÉSULTATS 2013

En 2013, 211 pharmacies ont participé à l'enquête (taux de participation : 14,2 %) et 534 malades ont été inclus. Le nombre moyen de malades était de 2,53 par pharmacie par semaine.

CARACTÉRISTIQUES DES MALADES

L'âge moyen était de 67,8 ans (médiane : 69 ; extrêmes : 4-106 ans), 40,4 % avait 75 ans ou plus. Il y avait 60,4 % de femmes et 39,6 % d'hommes.

PRESCRIPTEURS

Les médecins libéraux représentaient 88,3 % des prescripteurs, les hospitaliers 11,5 %. Un médecin exerçait en CSAPA.

Dans 88,2 % des cas, le prescripteur était généraliste, dans 11,8 % des cas, un spécialiste (cancérologie : 37,1 % ; centre anti-douleur : 9,7 % ; gastroentérologie : 9,7 % ; rhumatologie : 6,45 % ; radiologie : 6,45 % ; gériatrie : 4,8 % ; pneumologie : 3,2 % ; néphrologie : 3,2 % ; autres : 19,4 %).

MÉDICAMENTS

Les médicaments les plus prescrits sont, comme les années précédentes :

- par spécialité : Durogésic® et génériques (34,2 %), Skénan® (18,9 %), Actiskénan® (14,6 %) et Oxycontin® (14,5 %).

- par DCI : fentanyl (38,1 %), morphine (35,8 %) et oxycodone (24,8 %).


ANCIENNETÉ DU TRAITEMENT

Il s'agissait d'un nouveau traitement dans 17,6 % des cas, d'un traitement de plus d'un an dans 32,5 % des cas.

INDICATIONS

Dans 65,2 % des cas, il s'agissait d'une douleur chronique et dans 18,3 % des cas, d'une douleur aiguë (dans 2,5 % des cas, les deux).

En 2013, les indications rhumatologiques sont, comme depuis 2009, toujours majoritaires.



PRESCRIPTIONS DE FENTANYL

Fentanyl, toutes voies d'administration confondues

244 malades

âge moyen : 73,2 ans ; âge médian : 77 ans ; extrêmes : 4-106 ans

Fentanyl, durée d'action longue

218 malades

indication (connue dans 141 cas) : rhumatologie (n=54), cancérologie (n=49), neurologie (n=16), autres (n=23)

Fentanyl d'action rapide

26 malades (Abstral®, n=11 ; Instanyl®, n = 7 ; Actiq®, n=5 ; Pecfent®, n=2 ; Effentora®, n=1)

Indication (connue dans 19 cas) : cancérologie (n=13, traitement de fond toujours associé), neurologie (n=3), autres (n=3)

COMPARAISON DES 3 DERNIÈRES ENQUÊTES ASOS, 2011-2013

délivrance d'antalgiques stupéfiants	2011	2012	2013
nombre de pharmacies participantes	256	231	211
pas de délivrance dans la semaine (%)	11,3	15,2	13,7
nombre de sujets inclus	642	618	534
nombre moyen / semaine / pharmacie	2,51	2,68	2,53
âge moyen (médiane ; extrêmes)	65 (65 ; 6-98)	66,7 (67 ; 6-102)	67,8 (69 ; 4-106)
sexe (%)	H 39,2 ; F 60,8	H 42,4 ; F 57,6	H 39,6 ; F 60,4
prescripteurs libéraux (%)	82,2	82,4	88,3
médecins généralistes (%)	84,2	82,8	88,2
non-conformité (%)			
ordonnance non sécurisée	6,2	6,5	3,4
posologie en chiffres	13,9	18,3	14,2
carré de sécurité non rempli	18,8	14,9	14,5
espace dernière ligne/signature	32,9	33	26,1
spécialités les plus prescrites (%)	Durogésic® et génériques : 34,5	Durogésic® et génériques : 34	Durogésic® et génériques : 34,2
	Skénan® : 20,2	Skénan® : 17,5	Skénan® : 18,9
	Actiskénan® : 15,2	Actiskénan® : 14	Actiskénan® : 14,6
	Oxycontin® : 11,6	Oxycontin® : 13,7	Oxycontin® : 14,5
nouveaux traitements (%)	21	22,6	17,6
douleur calmée (%)	73,9	73	78,2
ancienneté traitement > 6 mois (%)	45	50,6	43,4

CONCLUSION

Cette enquête montre en 2013, un meilleur respect des règles de prescription des antalgiques stupéfiants et une diminution des indications hors AMM pour le fentanyl d'action rapide. Le fentanyl et la morphine sont toujours les antalgiques stupéfiants les plus prescrits avec une progression du sulfate de morphine. L'oxycodone est en 3^e position, de façon stable par rapport à 2012.